

FULTRIN FORTE

INSECTICIDA CONCENTRADO AUTOEMULSIONABLE

Insecticida, acaricida con efecto remanente

USO GANADERO Y ZOOSANITARIO

Insecticida polivalente de amplio espectro, con acción repelente y efecto remanente, indicado para la eliminación de insectos en todo tipo de instalaciones, del ámbito ganadero y zoonosanitario.

COMPOSICIÓN

El producto se presenta en forma de líquido concentrado autoemulsionable, a base de una combinación de Alfa-Cipermetrina y D-tetrametrina, en un medio orgánico anhidro y en presencia de un agente filmógeno.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

- Aspecto: líquido
- Color: amarillento
- Olor: característico
- Densidad: 1,003 ± 0,03 g/ml
- Solubilidad: autoemulsionable en agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Acción **polivalente** de amplio espectro
- Actúa por **ingestión y contacto**.
- Acción **repelente**.
- Efecto **remanente** gracias a la incorporación de un agente filmógeno, que forma una fina película sobre las zonas tratadas.
- En comparación con las piretrinas naturales, la Alfa-cipermetrina y la D-Tetrametrina presentan una mayor fotoestabilidad, una actividad muy superior y un efecto residual, conservando, además, la baja toxicidad para mamíferos propia de los piretroides.
- Presentan la propiedad de no degradarse con el agua, a diferencia de los insecticidas organofosforados, que se hidrolizan en medio acuoso.
- Gran **persistencia** debido a la fotoestabilidad de sus componentes y a la presencia del agente filmógeno.

DOSIS DE UTILIZACIÓN

Mantenimiento: 0,2% en emulsión acuosa (20 ml en 10 litros de agua).

Infestaciones moderadas: 0,3-0,5% en emulsión acuosa (30-50 ml en 10 litros de agua)

Fuertes infestaciones (Tratamiento de choque): 1% en emulsión acuosa (100 ml en 10 litros de agua).

Preparación de la emulsión

Añadir la cantidad adecuada de producto sobre una parte de agua (unas 10 veces la cantidad de producto), agitar para favorecer la emulsión, añadir el agua restante y agitar de nuevo.

Las emulsiones así preparadas pueden conservarse durante 30 días, en recipientes cerrados y preservadas de la luz: sólo será preciso agitar bien antes de volver a utilizarlas.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar las superficies a tratar con la emulsión antes indicada a razón de 1 litro de emulsión para 20 m².

En el caso de superficies porosas, y para los tres usos indicados, se recomienda aplicar a razón de 1 litro de emulsión para 10 m².

Plazo de seguridad: mantener la sala cerrada durante el plazo de seguridad recomendado de 12 horas.

Ventilar bien antes de volver a utilizar el recinto o la zona tratada.

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico.

ACTIVIDAD Y APLICACIONES

Activo frente a todo tipo de insectos: moscas, mosquitos, ácaros, cucarachas, hormigas, pulgas, piojos, garrapatas, etc.

Insecticida concentrado autoemulsionable de aplicación en todo tipo de instalaciones, del ámbito ganadero y zoonosanitario.

Aplicar exclusivamente por personal especializado.

PRECAUCIONES

Ver Ficha de Seguridad.

PRESENTACIÓN

Bombonas de 1 litro (en cajas de 6 bombonas)
Bombonas de 5 litros (en cajas de 4 bombonas)

REGISTROS Y NORMATIVA

Nº inscripción R.O.P.Z.: 01542-P (registro uso ganadero y zoonosanitario)

R.O.E.S.P.: B0104E

Conforme a la Directiva Europea de Biocidas 98/8/CE

Conforme al Reglamento Europeo REACH 1907/2006/CE y 453/2010/EC.