

Manual de Manejo en Maternidad.

*Se ingresa la cerda de 3 a 4 días antes del parto; la jaula debe estar lavada y desinfectada. Se procede a llenar los datos de la cerda en la hoja de maternidad. Empezar a alimentar la cerda primeros días poca comida 2k diarios luego ir subiendo hasta darle libre consumo 3 veces al día.

Se debe contar con los siguientes materiales en el parto:

-Iodo con agua en un balde.

-Pinza hermostatica.

-Papel Periódico

-Alcohol, piola.

-Lepecid o matagusanos.

-Guantes ginecológicos.

-Gel para partos.

-Balanza Manual.

-2 Canastas para meter cerdos.

*En caso de aplicar sincrosio se sincroniza un día antes según la hora del día que está pautado el parto.

*Antes del parto bañar la cerda con iodo, con la salida del primer lechón agarrarlo y secarlo en la canasta con periódico. NOTA: se debe sacar calostros para cerdos con baja viabilidad

*Luego limpiar la parte trasera de la cerda y la zona de la jaula donde cae el lechón con cepillo(esto se hace cada vez que sale un lechón). Para evitar el contacto de lechón con las heces fecales de la cerda.

*Luego se pesa lechón identificando el peso y el sexo. Cortar rabo y oreja y colocar iodo o matagusanos preferiblemente.

*Posteriormente se coloca el lechón a calostrear para estimular a la cerda; así con los primeros lechones. Luego se procede a seleccionar y separar lechones pequeños y grandes.

*Se debe sacar calostros en envases para cerdos de bajo peso o problemas al nacer. Por último se debe colocar a calostrear los lechones más pequeños con su madre y luego ir rotando a los grandes.

*Al segundo día después del parto, colocar gentamicina como preventivo según manejo de cada granja.

*Al tercer día se procede a descolmillar, colocar 1ml de tolptox o bycox (toltrazurilo) y 2ml de hierro. A la madre se le coloca oxitetraciclina 12ml.

*Al quinto o sexto día se realiza la castaracion, los cerdos con monorquidea (herniados) son muesquiados en las orejas.

*Al séptimo día se le coloca parvovirus a la madre, y contra la neumonia a los lechones (respisure) e iniciarlos al alimento predestete.

*Al día 12 se le coloca vitamina, fósforo, calcio a la cerda

*Un día antes del destete, vacunar contra circo virus y neumonia y hacer la desparasitacion de los lechones.

Puntos clave:

La cerda debe estar limpia en su parte posterior por lo menos dos o tres días hasta que cierre el útero.

En caso de complicarse el parto aplicar oxitocina después del lechón 10 y meter la mano debido a que los lechones pueden salir ahogados ya que se desprenden.

Homogeneizar lechones que sean camadas de la misma semana.

Colocar selenio al destetar la cerda(farbiofos) para ayudar a la reproductividad.

Limpieza en seco no permitir el contacto de lechón con las heces de la madre ya que esto trae como consecuencias diarreas.

T.S.U Pedro Villegas

Técnico Superior Universitario

Producción agroalimentaria

